Guidelines d'utilisation des IPP : Prévention des ulcères induits par le stress aux Soins Intensifs

Prévention des ulcères induits par le stress aux Soins Intensifs

↓

Si ≥ 1 facteur de risque

- Ventilation mécanique > 48h
- Troubles de la coagulation
- Sepsis sévère
- Insuffisance hépatique ou rénale aiguë
- Traumatisme majeur (TCC sévère, poly-traumatisme)
- Transplantés récents
- Grands brûlés (> 35% de la surface corporelle)
- Chirurgie majeure (p.ex. résection hépatique, pancréatique ou gastrique majeure)
- Antécédents d'ulcère ou de complication gastro-duodénale grave
- Etat de choc (cardiogénique, hypovolémique ou septique)

↓

Pantoprazol 40 mg 1x/j
durant la présence des facteurs de risque et le séjour aux Soins Intensifs

↓

Si le patient ne peut pas avaler ou a une sonde naso-gastrique
Esomep MUPS 20 mg 1x/j
(à diluer dans de l'eau, sans écraser !)

Si la voie digestive est impossible
Pantoprazol i.v. 40 mg 1x/j

Source : Liste des médicaments à consulter sur www.pij.ch

© Pharmacie Interjurassienne : Ce contenu n'est pas autorisé à être copié et repris sur un autre site WEB ou tout autre média.