

Equivalences entre les opiacés

Principe actif Spécialités	Durée action du p.a.	Ratio oral : parent.	Formes d'application	Doses équi- analgé- siques approx. [mg]	Posologie initiale proposée (adulte, forme standard)
Buprénorphine <i>Buprénorphine</i> <i>Temgesic</i>	6-8 h	3 : 1	p.o. (sublingual)	0.6	0.2 mg 3-4x/j
			i.m./i.v.	0.3	0.3 mg 3-4x/j
Codéine <i>Codéine</i>	4-8 h	2 : 1	p.o.	200-300	50 mg 3-6x/j
Fentanyl <i>Fentanyl</i>	1-2 h	-	i.m./i.v.	0.1	50 mcg 12-24x/j
Hydro- morphone <i>Palladon</i>	4-5 h	-	p.o.	4-6	1.3 mg 6x/j
		3 : 1	i.v.	1-2	0.5-1 mg 6x/j
		2 : 1	s.c.	2-3	
Méthadone <i>Méthadone</i> <i>Ketalgin</i>	3-40 h	2 : 1	p.o./rectal	20-30	Titration indiv.
			s.c./i.m./i.v.	10	Titration indiv.
Morphine <i>Morphine</i> <i>Sevredol</i> <i>MST, Kapanol</i>	4-6 h	-	p.o./rectal	30	10 mg 6x/j
		3 : 1	i.v.	10	5 mg
		2 : 1	s.c.	15	6x/j
Oxycodone <i>Oxynorm</i> <i>Oxycontin</i>	4-6 h	-	p.o.	15-20	5 mg 6x/j
Péthidine <i>Pethidine</i>	2-4 h	3 : 1	p.o./rectal	300	100 mg 6-8x/j
			s.c./i.m./i.v.	100	50 mg 6-8x/j
Tramadol <i>Tramadol</i>	3-7 h	-	p.o./rectal	150-200 max 400/j	50 mg 3-4x/j

Source : Liste des médicaments à consulter sur www.pij.ch

© Pharmacie Interjurassienne : Ce contenu n'est pas autorisé à être copié et repris sur un autre site WEB ou tout autre média.