

# PIJ Info – Bulletin n°75

Bulletin d'information de la Commission des Médicaments de la  
Pharmacie interjurassienne et de la PIJ officine

ComMed du 16 juin 2026

## Dans cette édition

|                                                                                    |          |                                                    |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|----------|
| <b>Liste des médicaments</b>                                                       | <b>2</b> | <b>Alerte vigilance</b>                            | <b>8</b> |
| Médicaments remplacés                                                              | 2        | J'ai tout PIJé #12 : Demi-comprimés de stupéfiants | 8        |
| Médicaments supprimés                                                              | 4        |                                                    |          |
| Médicaments introduits                                                             | 4        |                                                    |          |
| <b>Introduction en liste de l'Ézétimibe</b>                                        | <b>6</b> |                                                    |          |
| Ézétimibe : une place croissante dans la prise en charge de l'hypercholestérolémie |          |                                                    |          |

### Impressum

#### Secrétariat

Pharmacie interjurassienne

Beausite 49

2740 Moutier

Tél : 032 494 30 50

Fax : 032 494 30 42

PIJ Info | Bulletin n°75 – 15 juillet 2026  
[joel.wermelle@reseaudelarc.net](mailto:joel.wermelle@reseaudelarc.net)

[nesma.bensalah@reseaudelarc.net](mailto:nesma.bensalah@reseaudelarc.net)

### Commission des Médicaments

Mme Nesma Bensalah

Dre Martine Décosterd

Mme Catia Filieri

Dr Cédric Maillat

Dr André-Philippe Méan

Dr Marc Pierrehumbert

Dr Jean-Marie Sengelen

Dre Bettina Simon

Dr Riccardo Vandoni

Dr Joël Wermeille

## Liste des médicaments

### Médicaments remplacés

| Médicament remplacé                                                                                                                         | Raison                                             | Médicament de remplacement                                                                   | Statut                                                                                                                                            | Lieux stockage et qté min.                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACETYLCYSTEINE cpr eff. 200 mg<br>(acétylcystéine)                                                                                          | Médicament hors-commerce<br>Réévaluation générique | MUCO MEPHA gran sach. 200 mg<br>(acétylcystéine)                                             | Médicament disponible pour<br>l'ensemble des services                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ATROPINUM SULF amp. 1 mg/1 mL<br>(atropine sulfate)                                                                                         | Médicament hors-commerce                           | ATROPINUM SULF amp. 0.5 mg/1 mL<br>(atropine sulfate)                                        | Médicament disponible pour<br>l'ensemble des services<br><br>Antidote/Assortiment de base<br>(hôpitaux de soins aigus)                            | <u>Delémont</u> : Pharmacie (80 pces),<br>Soins Intensifs (20 pces)<br><u>Moutier</u> : Pharmacie (80 pces),<br>Urgences (20 pces)<br><u>Porrentruy</u> : Pharmacie (80 pces),<br>Urgences (20 pces)<br><u>Saint-Imier</u> : Pharmacie (80 pces),<br>Surveil. Intensive (20 pces) |
| CALCIUM BICHSEL amp.<br>90 mg/10 mL<br>(calcium glubionate)<br><b>Et</b><br>CALCIUM CHLORURE 8.8% amp.<br>441 mg/5 mL<br>(calcium chlorure) | Médicaments hors-commerce                          | CALCIUM GLUCONATE 10 %<br>miniplasco 10 mL (IMP D)<br>(calcium gluconate)                    | Médicament disponible pour<br>l'ensemble des services<br><br>Antidote/Assortiment de base<br>(hôpitaux de soins aigus)<br><br>Médicament étranger | <u>Delémont</u> : Pharmacie (15 pces),<br>Soins Intensifs (5 pces)<br><u>Moutier</u> : Pharmacie (15 pces),<br>Urgences (5 pces)<br><u>Porrentruy</u> : Pharmacie (15 pces),<br>Urgences (5 pces)<br><u>Saint-Imier</u> : Pharmacie (15 pces),<br>Surveil. Intensive (5 pces)     |
| HEPARINE amp. 500 UI/5 mL<br>(rinçage des cathéters)<br>(héparine sodique)                                                                  | Médicament hors-commerce                           | HEPARIN-NATRIUM amp.<br>500 UI/5 mL (IMP D)<br>(rinçage des cathéters)<br>(héparine sodique) | Médicament disponible pour<br>l'ensemble des services<br><br>Médicament étranger                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INFLECTRA fio. 100 mg<br>(infliximab)                                                                                                       | Réévaluation biosimilaire                          | REMSIMA flac. 100 mg<br>(infliximab)                                                         | Médicament réservé (Unité<br>ambulatoire)                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Médicament remplacé                                                  | Raison                                                        | Médicament de remplacement                                           | Statut                                                                                                                                            | Lieux stockage et qté min.                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAGNESIUM SULFATE 10%<br>amp. 10 mL<br>(magnesium sulfate)           | Médicament hors-commerce                                      | MAGNESIUM SULFATE 10%<br>amp. 10 mL (IMP D)<br>(magnesium sulfate)   | Médicament disponible pour<br>l'ensemble des services<br><br>Antidote/Assortiment de base<br>(hôpitaux de soins aigus)<br><br>Médicament étranger | <u>Delémont</u> : Pharmacie (10 pces),<br>Soins Intensifs (10 pces)<br><u>Moutier</u> : Pharmacie (10 pces),<br>Urgences (10 pces)<br><u>Porrentruy</u> : Pharmacie (10 pces),<br>Urgences (10 pces)<br><u>Saint-Imier</u> : Pharmacie (10 pces),<br>Surveil. Intensive (10 pces) |
| METRONIDAZOLE cpr. 500 mg<br>(métrotridazole)                        | Médicament hors-commerce<br>Réévaluation générique            | METROLAG cpr. 500 mg<br>(métrotridazole)                             | Médicament disponible pour<br>l'ensemble des services                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| NACL 0.9% flac. 250 mL<br>(solution de rinçage)<br>(sodium chlorure) | Produit hors-commerce                                         | NACL 0.9% flac. 500 mL<br>(solution de rinçage)<br>(sodium chlorure) | Médicament disponible pour<br>l'ensemble des services                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PROPOFOL LIPURO fio. 1% 20 mL,<br>1% 50 mL et 2% 50 mL<br>(propofol) | Réévaluation générique                                        | PROPOFOL MCT flac. 1% 20 mL,<br>1% 50 mL et 2% 50 mL<br>(propofol)   | Médicament disponible pour<br>l'ensemble des services                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PROVEBLUE amp. 50 mg/10 mL<br>(bleu de méthylène)                    | Médicament hors-commerce                                      | PROVEBLUE amp 50 mg/10 mL<br>(IMP D)<br>(bleu de méthylène)          | Antidote/Assortiment<br>complémentaire (centre régional)<br><br>Médicament étranger                                                               | <u>Delémont</u> : Soins Intensifs (10 pces)                                                                                                                                                                                                                                       |
| SUCCINOLIN amp. 5%, 100 mg/2 mL<br>(suxaméthonium)                   | Médicament en rupture de stock<br>prolongée chez le fabricant | SUXAMETHONIUM ser. prête<br>10 mg/mL<br>(suxaméthonium)              | Médicament disponible pour<br>l'ensemble des services<br><br>A conserver au frigo<br>Une fois sorti, conserver 30 jours<br>à T° ambiante          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Médicaments supprimés

| Médicament supprimé                              | Raison                                                                | Alternative en liste                                                                                            | Statut                                               | Lieux stockage et qté min. |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|
| ASPEGIC pdr. 100 mg<br>(acide acétylsalicylique) | Médicament hors-commerce                                              | ASPIRINE CARDIO cpr pell 100 mg<br>(acide acétylsalicylique).<br>Si besoin, possibilité d'écraser les comprimés | Médicament disponible pour l'ensemble des services   | -                          |
| NOVALGINE supp. 1000 mg<br>(métamizole)          | Médicament hors-commerce                                              | VOLTARENE supp. 100 mg<br>(diclofénac)                                                                          | Médicaments disponibles pour l'ensemble des services | -                          |
| REMICADE fio. 100 mg<br>(infliximab)             | Réévaluation biosimilaire<br>Maintien d'une seule spécialité en liste | REMSIMA flac. 100 mg<br>(infliximab)                                                                            | Médicament réservé (Unité ambulatoire)               | -                          |

## Médicaments introduits

| Nouveau médicament                                                                    | Indication                                                                                                      | Statut                                                                                                                       | Lieux stockage et qté min.                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ABILIFY ASIMTUFI dépôt ser. prête<br>720 mg/2.4 mL et 960 mg/3.2 mL<br>(aripiprazole) | Traitement d'entretien de la schizophrénie chez les patients adultes préalablement stabilisés sous aripiprazole | Médicament réservé (service de Psychiatrie)                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                             |
| ACTILYSE subst. sèche 10 mg<br>(altéplase)                                            | Thrombolyse lors d'infarctus aigu du myocarde, embolie pulmonaire massive, AVC ischémique                       | Médicament réservé (Ajout du service des Urgences en plus du service des Soins Intensifs)                                    | -                                                                                                                                                                                                             |
| ACTILYSE subst. sèche 50 mg<br>(altéplase)                                            | Thrombolyse lors d'infarctus aigu du myocarde, embolie pulmonaire massive, AVC ischémique                       | Médicament réservé (Ajout du service des Urgences en plus du service des Soins Intensifs et du SMUR)<br>Médicament d'urgence | <u>Delémont</u> : Soins Intensifs (4 fio.)<br><u>Moutier</u> : Surveil. Intensive (4 fio.),<br><b>Urgences (4 fio.)</b><br><u>Porrentruy</u> : SMUR (2 fio.)<br><u>St-Imier</u> : Surveil. Intensive (4 fio.) |
| BULBOID supp. enfant 0.878 g<br>(glycérol)                                            | Constipation chez l'enfant                                                                                      | Médicament réservé (service de Pédiatrie)                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                             |

| Nouveau médicament                         | Indication                                                                                                                          | Statut                                               | Lieux stockage et qté min. |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|
| EZETIMIB cpr. 10 mg<br>(ézétimib)          | Hypercholestérolémie<br><b>Voir page 6 :</b> « Ézétimibe : une place croissante dans la prise en charge de l'hypercholestérolémie » | Médicaments disponibles pour l'ensemble des services | -                          |
| TAUROLOCK U flac. 25 000 UI<br>(urokinase) | Désobstruction des cathéters de dialyse                                                                                             | Médicaments disponibles pour l'ensemble des services | -                          |

**Médicament réservé :** disponible sans ordonnance interne pour les services concernés (sauf cas particuliers).

NB

## Introduction en liste de l'Ézétimibe

### Ézétimibe : une place croissante dans la prise en charge de l'hypercholestérolémie

L'ézétimibe est un hypolipémiant enregistré en Suisse depuis de nombreuses années et dont le mécanisme d'action repose sur une inhibition de la protéine NPC1L1 responsable de l'absorption de cholestérol au niveau de l'intestin grêle. Ce mécanisme d'action conduit à une diminution de l'absorption intestinale du cholestérol alimentaire et biliaire, et permet globalement une baisse du LDL-Cholestérol de 0.8 à 1 mmol/L (correspondant à une baisse d'environ 20%). Bien que les données issues des études cliniques indiquent une efficacité modeste de l'ézétimibe sur les critères de morbi-mortalité, cette molécule est de plus en plus prescrite pour les raisons suivantes :

- Les nouvelles recommandations de l'ESC (European Society of Cardiology) préconisent des objectifs de LDL-cholestérol très bas, notamment en prévention secondaire chez les patients atteints de maladies cardiovasculaires ischémiques (valeurs cibles de l'ordre de 1,4 à 1,8 mmol/L), et peuvent conduire à l'introduction d'une bithérapie (la statine seule n'étant pas toujours suffisante pour atteindre les valeurs cibles).
- En cas d'intolérance aux fortes doses de statines ou de non atteinte des objectifs de réduction du LDL-Cholestérol, l'ajout d'ézétimibe à la dose maximale tolérée de statine peut représenter une option thérapeutique pertinente.

#### Données issues des études de morbi-mortalité

La majorité des essais cliniques randomisés ayant comparé l'association « statine-ézétimibe » à une statine seule étaient de petite taille et présentaient plusieurs limites méthodologiques, à l'exception de l'étude IMPROVE-IT, qui constitue actuellement l'étude de référence pour définir la place de l'ézétimibe dans l'arsenal thérapeutique (en particulier dans la prévention cardiovasculaire secondaire après un syndrome coronarien aigu).

Ce travail portait sur 18 144 patients ayant présenté un syndrome coronarien aigu, suivis pendant une durée médiane de 6 ans [1]. À 7 ans, l'ajout d'ézétimibe 10 mg à la simvastatine 40 mg réduisait le critère composite principal (décès cardiovasculaire, événement coronarien majeur, ou AVC non fatal) de 34,7 % à 32,7 % soit une réduction absolue du risque de 2 % (RR 0.94, IC 95% 0.89-0.99,  $p=0.016$ , NNT = 50), correspondant à une baisse absolue moyenne de 0.3% par année.

En termes de réduction absolue du risque, l'ajout de l'ézétimibe à la simvastatine permettait de réduire :

- Le risque d'infarctus du myocarde (fatal ou non fatal), de 1,7 % à 7 ans (NNT = 58), ce qui correspondait à une réduction absolue moyenne d'environ 0,24 % par année ( $p = 0,002$ ).
- Le risque d'AVC (toute cause confondue), de 0.6 % à 7 ans (NNT = 167), ce qui correspondait à une réduction absolue moyenne d'environ 0,09 % par année ( $p = 0,05$ ).

Le taux de mortalité toutes causes confondues et de mortalité cardiovasculaire était similaire entre les deux groupes.

## Conclusion

Au regard des éléments présentés ci-dessus, la Commission des Médicaments prend la décision d'introduire l'ézétimibe dans la liste des médicaments, malgré le bénéfice clinique relativement modeste selon les études cliniques disponibles. Elle considère néanmoins que le recul important dont bénéficie désormais cette molécule justifie son utilisation en deuxième intention, après les statines, lorsque celles-ci sont insuffisamment efficaces ou contre-indiquées. Dans la plupart des situations, l'ézétimibe devrait être privilégié avant l'acide bempédoïque, dont le profil efficacité/risque est moins bien documenté, et avant les inhibiteurs de PCSK9, dont le coût est nettement plus élevé et la prise en charge par l'assurance obligatoire des soins soumise à des critères restrictifs.

## Référence

[1]

Cannon CP, Blazing MA, Giugliano RP, et al. Ezetimibe added to statin therapy after acute coronary syndromes. N Engl J Med 2015; 372: 2387-97. <https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1410489>

PAJ et JW

## Alerte vigilance

### J'ai tout PIJé #12 : Demi-comprimés de stupéfiants

« J'ai une prescription d'un demi-comprimé de Sevredol® 10 mg (morphine).  
Est-ce que je peux garder le demi-comprimé pour une prochaine utilisation ? »

Bons réflexes lors de l'administration d'une demi-dose de stupéfiant :

1. Toujours **s'assurer qu'aucun dosage inférieur** n'est disponible.
2. Toujours **s'assurer de la sécabilité/divisibilité** des comprimés/patchs.
3. **Éliminer immédiatement le reliquat** : jeter la fraction restante dans le **bac jaune « coupant/tranchant »**. La conservation d'une demi-dose hors de son conditionnement d'origine (blister, sachet) n'est pas garantie et présente un risque d'erreur ou de détournement.
4. Garantir la **traçabilité** : Noter explicitement sur la fiche de suivi des stupéfiants la dose administrée ainsi que la destruction de la fraction restante (voir exemple ci-dessous) :

| Feuille de stupéfiants vierge                            |                                          |                      |                          |          |       |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------|-------|
| Médicament - Forme - Dosage : Sevredol cpr 10 mg 20 pces |                                          |                      |                          |          |       |
| Service : Nom du service demandeur                       |                                          |                      |                          |          |       |
| N° fiche stupéfiant : XXXXXX                             |                                          |                      |                          |          |       |
| Date                                                     | Patient (nom/prenom)                     | Médecin (nom/prenom) | Infirmier.e (nom/prenom) | Quantité | Solde |
| xxxxxx                                                   | Nom Prénom patient                       | Nom du prescripteur  | Nom Prénom infirmier.ère | 1/2 cpr  | 19.5  |
| xxxxxx                                                   | Nom Prénom patient<br>Demi-dose éliminée | Nom du prescripteur  | Nom Prénom infirmier.ère | 1/2 cpr  | 19    |



#### Messages clé

**Privilégier** l'utilisation des comprimés/patchs **entiers** dans la mesure du possible  
**Toujours jeter** la deuxième partie dans un **bac jaune « coupant/tranchant »**  
**Tracer l'élimination** sur la fiche de suivi des stupéfiants

## Référence

[1]

Gestions des médicaments stupéfiants dans les pharmacies  
d'unités de soins gérés par une assistante en pharmacie,  
disponible sur la GED

### **Rédaction et mise en page**

Nesma Bensalah (NB), Nina Cazier (NC), Pierre-Alain Jolivot (PAJ), Joël Wermeille (JW)

### **Relecture**

Nesma Bensalah (NB), Carine Jacomet (CJ), Pierre-Alain Jolivot (PAJ), Joël Wermeille (JW)

### **Validation**

Sur la base du PV de la séance de la ComMed du 16 juin 2026 :  
Mme Nesma Bensalah, Dre Martine Décosterd, Mr Camille Lanfranchi, Dr Cédric Maillat, Dr André-Philippe Méan, Dr Marc Pierrehumbert, Dr Jean-Marie Sengelen, Dr Riccardo Vandoni, Dr Joël Wermeille

### **Information complémentaire**

La Commission des Médicaments et la Pharmacie interjurassienne se tiennent à votre disposition pour toute question portant sur son fonctionnement ou ses décisions. Les références utilisées pour la rédaction des articles sont à disposition auprès du secrétariat.



Scannez ce QR code pour accéder à  
notre site internet [www.pij.ch](http://www.pij.ch).

### **Pharmacie interjurassienne**

Beausite 49  
2740 Moutier  
Tél : 032 494 30 50  
[www.pij.ch](http://www.pij.ch)